

รายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน 52 รายการ (ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศ  
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐)

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ	1	ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Aluminium Hydroxide 200-600 mg. Magnesium Hydroxide 200-400 mg.	บรรเทาอาการจุก เสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และ ปวดท้อง เนื่องจากมีกรด มาก ในกระเพาะ อาหารหรือแผล ในกระเพาะ อาหารและลำไส้	ช่วยยาก่อนกลืน รับประทานก่อน อาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือหลัง อาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้ง ละ 1-4 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้ง ละ 1-2 เม็ด	1) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจ หรือโรคไต 2) ไม่ควร รับประทานเป็น เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก แพทย์สั่ง สำหรับ ตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผล วิเคราะห์ที่แสดง ว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด รับประทานต่อ วันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้ง คำเตือนดังนี้ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคไต 2) ไม่ควร รับประทานเป็น เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก แพทย์สั่ง	เก็บที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 40 องศา เซลเซียส	แผงพลาสติกหรือ อลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
	2	ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม	ในสูตรตำรับ 5 มิลลิกรัมประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Aluminium Hydroxide 165-650 mg. Magnesium Hydroxide 103-500 mg.	บรรเทาอาการจุก เสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และ ปวดท้อง เนื่องจากมีกรด มาก ในกระเพาะ อาหารหรือแผล ในกระเพาะ อาหารและลำไส้	เข่าขูดก่อนใช้ยา รับประทานก่อน อาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมี อาการ ผู้ใหญ่ รับประทาน ครั้งละ 1-4 ซ้อนชา เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ซ้อนชา เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ซ้อนชา	1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็น โรคหัวใจหรือโรคไต 2) ไม่ควรรับประทาน เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก แพทย์สั่ง สำหรับ ตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่ แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด รับประทานต่อวัน ไม่ เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งค่าเดือนดังนี้ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็น โรคไต 2) ไม่ควรรับประทาน เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก แพทย์สั่ง	เก็บที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 40 องศา เซลเซียส	ขวดละ 240 มิลลิกรัม และ 450 มิลลิกรัม

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
	3	ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อโซดาามินท์	ในสูตรตำรับ 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Bicarbonate 300 mg. Peppermint Oil 0.003 ml.	บรรเทาอาการจุก เสียด ลดอาการ ระคายเคือง เนื่องจากมีกรด มากในกระเพาะ อาหาร	รับประทานหลัง อาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่รับประทาน ครั้งละ 3-6 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 เม็ด	1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็น โรคไต 2) ไม่ควรรับประทาน เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก แพทย์สั่ง	เก็บที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 40 องศา เซลเซียส	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
	4	ยาขับลม	ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา สำคัญ คือ Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml. Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml. Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml.	บรรเทาอาการ ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับ ลมในกระเพาะ อาหาร	เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทาน ครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อน โต๊ะ	ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสม อยู่ .....% ควรใช้ด้วย ความระมัดระวัง	เก็บที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 40 องศา เซลเซียส และ ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
	5	ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุ น้ำแดง	ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยด้วยยา สำคัญ คือ Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g. Compound Rhubarb Tincture 0.50-2.00 ml. และ/หรือ Tincture อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่ Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml. Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml. Compound Tinospora Tincture 0.50 ml. Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml. Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml. Nux Vomica Tincture 0.09-0.10 ml. Ipecacuanha Tincture 0.18-0.30 ml. และ/หรือ volatile Substance อื่นๆ ที่มีสรรพคุณ ทางยา ได้แก่ Peppermint Spirit 0.15-0.30 ml. Peppermint Oil 0.03-0.20 ml. Menthol 0.05-0.30 ml. Concentrated Dill Water 0.10 ml. Camphor 19.00 mg.	บรรเทาอาการ ปวดท้อง เนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ	เข่าขูดก่อนใช้ยา รับประทานก่อน อาหารวันละ 3 ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทาน ครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อน โต๊ะ	1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็น โรคหัวใจหรือโรคไต 2) ไม่ควรรับประทาน เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก แพทย์สั่ง 3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ ผสมอยู่ .....% ควรใช้ ด้วยความระมัดระวัง	เก็บที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 40 องศา เซลเซียส และ ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
	6	ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียม ไบคาร์บอเนต	ในสูตรตำรับ 5 มิลลิกรัม ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Bicarbonate 50 mg. โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็น ส่วนผสม	บรรเทาอาการ ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรด มากในกระเพาะ อาหาร	ใช้ป้อนให้ทารก และเด็กหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ ไม่ควรให้เกินวัน ละ 6 ครั้ง เด็กอายุ 2-3 ปี ครั้ง ละ 2-3 ช้อนชา เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 2 ช้อนชา เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 1 ช้อนชา ทารกแรกเกิด-1 เดือน ไม่ควรใช้	1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็น โรคหัวใจหรือโรคไต 2) ไม่ควรรับประทาน เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก แพทย์สั่ง	เก็บที่อุณหภูมิตำ กว่า 40 องศา เซลเซียส และ ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	ขวดละ 60 มิลลิกรัม
	7	ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์ มหาหิงคุ์	ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Asafetida 20 % w/v	บรรเทาอาการ ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก	ทาบางๆ ที่หน้า ท้อง วันละ 2-3 ครั้ง	ห้ามรับประทาน	เก็บที่อุณหภูมิตำ กว่า 40 องศา เซลเซียส และ ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	ขวดละ 15 มิลลิกรัม 30 มิลลิกรัม และ 60 มิลลิกรัม

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
2. ยาแก้ท้องเสีย	8	ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่	ในสูตรตำรับ 1 ของ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Chloride 0.875 g. Sodium Bicarbonate 0.625 g. Potassium Chloride 0.375 g. Glucose - Anhydrous 5.000 g. หรือในสูตรตำรับ 1 ของ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Chloride 0.875 g. Trisodium Citrate Dihydrate 0.725 g.. Potassium Chloride 0.375 g. Glucose Anhydrous 5.000 g.	ทดแทนการเสีย น้ำในรายที่มี อาการท้องร่วง หรือในรายที่มี อาเจียนมากๆ และป้องกัน การช็อคเนื่องจาก การที่ร่างกายขาด น้ำ	เทพยยาทั้งซอง ละลายในน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุกที่เย็น แล้ว ประมาณ 250 มิลลิลิตร (1 แก้ว) ให้ดื่มมากๆ เมื่อ เริ่มมีอาการ ท้องร่วง ถ้าถ่าย บ่อยให้ดื่มบ่อยครั้ง ขึ้น ถ้าอาเจียนด้วย ให้ดื่มทีละน้อยแต่ บ่อยครั้ง เด็กอายุมากกว่า 2 ปี-ผู้ใหญ่ ให้ดื่ม สารละลายเกลือแร่ ประมาณ 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) ต่อ การถ่ายอุจจาระ 1 ครั้ง หรือตามความ กระหายของผู้ป่วย	1) ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือโรคไต ควร ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ 2) ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการ อาเจียนมาก เหงื่อออก มาก ตัวเย็น ความรู้สึก เปลี่ยนแปลงไป หรือ หมดสติ ควรนำผู้ป่วย ส่งโรงพยาบาลโดย ด่วน	1) เก็บในที่แห้ง และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด 2) ยาที่ละลายน้ำ แล้วเกิน 24 ชั่วโมง ไม่ควรใช้	1 ซองสำหรับ ผสมน้ำ 250 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
					เด็กอ่อน-เด็กอายุ 2 ปี ให้ดื่มทีละน้อย สลับกับน้ำเปล่า ประมาณวันละ 3 ชองหรือมากพอที่ คนไข้ต้องการและ ดื่มต่อไปจนกว่า อาการจะดีขึ้น			
3. ยาระบาย	9	ยาระบายกลีเซอริน ชนิดเหน็บทวาร สำหรับเด็ก	ในสูตรตำรับ 1 แห่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Glycerin 91 % w/w	สำหรับบรรเทา อาการท้องผูก ใช้ เหน็บทวารหนัก เพื่อช่วยการ ขับถ่าย	ใช้เหน็บทวารหนัก ครั้งละ 1 แห่ง เมื่อ ต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที เพื่อให้ตัวยาละลาย	ไม่ควรใช้เป็นประจำ	เก็บในตู้เย็น และ ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	แห้งละ 1.5 กรัม บรรจุแผง
	10	ยาระบายกลีเซอริน ชนิดเหน็บทวาร สำหรับผู้ใหญ่	ในสูตรตำรับ 1 แห่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Glycerin 91 % w/w	สำหรับบรรเทา อาการท้องผูก ใช้ เหน็บทวารหนัก เพื่อช่วยการ ขับถ่าย	ใช้เหน็บทวารหนัก ครั้งละ 1 แห่ง เมื่อ ต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที เพื่อให้ตัวยาละลาย	ไม่ควรใช้เป็นประจำ	เก็บในตู้เย็น และ ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	แห้งละ 2.55 กรัม บรรจุแผง
	11	ยาระบาย แมกนีเซีย	ในสูตรตำรับ 15 มิลลิกรัม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Magnesium Hydroxide 1.2 g.	ยาระบาย	เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานก่อน นอนหรือตื่นนอน เช้า ผู้ใหญ่ รับประทาน ครั้งละ 2-3 ช้อน โต้ะ (30-45 มิลลิกรัม)	1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการ ปวดท้อง หรือคลื่นไส้ อาเจียน 2) ไม่ควรรับประทาน เป็นประจำ	เก็บที่อุณหภูมิ ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส	ขวดละ 60 มิลลิกรัม และ 120 มิลลิกรัม

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
					เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15- 30 มิลลิลิตร) เด็ก 1-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 ช้อนชา (5-15 มิลลิลิตร)			
	12	ยาระบาย มะขามแขก	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ ฝักมะขามแขกที่เอาเมล็ดออกแล้ว ซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B 7.5 mg.	ยาระบาย	รับประทานก่อน นอนหรือตื่นนอน เช้า ผู้ใหญ่ รับประทาน ครั้งละ 3-4 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด	1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการ ปวดท้องหรือคลื่นไส้ อาเจียน 2) หญิงมีครรภ์หรือให้ นมบุตรควรปรึกษา แพทย์ก่อนใช้ยา 3) ไม่ควรรับประทาน เป็นประจำ	เก็บในที่แห้ง และอุณหภูมิต่ำ กว่า 30 องศา เซลเซียส	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
	13	ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร	ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Chloride 15 % w/v	สำหรับบรรเทา อาการท้องผูก ใช้ สวนทวารให้ถ่าย อุจจาระ	สวนเข้าทางทวาร หนัก แล้วกลืนไว้ จนทนไว้ให้แข็งเข้า ส้วม ผู้ใหญ่ ใช้ครั้งละ 20-40 มิลลิลิตร เด็ก 6-12 ปี ใช้ครั้ง ละ 10-20 มิลลิลิตร เด็ก 1-6 ปี ใช้ครั้ง ละ 5-10 มิลลิลิตร	ไม่ควรใช้เป็นประจำ	เก็บที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 40 องศา เซลเซียส	หลอดพลาสติก 10 มิลลิลิตร และ 20 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
4. ยาถ่ายพยาธิ ถ้าได้	14	ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มี เบนดาโซล	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Mebendazole 100 mg.	ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม	<p>เกี่ยวยาให้ละเอียด ก่อนกลืน สำหรับพยาธิ เส้นด้ายและพยาธิ เข็มหมุด ทั้งเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร เย็นเพียงครั้งเดียว สำหรับพยาธิตัว กลมอื่นๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิ ไส้เดือน และพยาธิ แส้ม้า ทั้งเด็กอายุ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและ เย็นติดต่อกัน 3 วัน และอาจ รับประทานซ้ำอีก 1 เม็ด หลังจากการ รักษาครั้งแรก 2 สัปดาห์ต่อมา</p>	<p>1) ไม่ควรใช้ในหญิงมี ครรภ์ในระยะ 3 เดือน แรก และผู้ที่เป็โรค ตบ 2) ห้ามใช้ในเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี</p>	ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 6 เม็ด

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้	15	ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก.	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Paracetamol 500 mg.	ลดไข้ บรรเทา อาการปวด	รับประทานหลัง อาหารทันทีหรือ ขณะท้องไม่ว่าง แล้วดื่มน้ำตา มมากๆ รับประทานทุกๆ 4 -6 ชั่วโมงเมื่อมี อาการ ไม่ควร รับประทานเกินวัน ละ 5 ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทาน ครั้งละ 1-2 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด	1) ห้ามใช้ในเด็กอายุ ต่ำกว่า 1 ปี และหญิงมี ครรภ์ระยะใกล้คลอด 2) ห้ามใช้สำหรับลด ไข้ในผู้ป่วยเป็นโรค ไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส และไข้เลือดออก 3) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็น โรคแผลในระบบ ทางเดินอาหารและ โรคหอบหืด 4) ห้ามใช้สำหรับ รักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการทำงาน หนัก	เก็บที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 40 องศา เซลเซียส	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
	16	ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 325 มก.	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Paracetamol 325 mg.	ลดไข้ บรรเทา อาการปวด	รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อ มีอาการ ไม่ควร รับประทานเกินวัน ละ 4 ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทาน ครั้งละ 1-2 เม็ด	1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาด ที่ระบุไว้บนฉลาก หรือเอกสารกำกับยา จะทำให้เป็นพิษต่อ ตับได้ และไม่ควรใช้ ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน	เก็บที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 40 องศา เซลเซียส	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
					เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 เม็ด	2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือ เกสัชกรก่อนใช้ยา 3) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากการทำงานหนัก		
	17	ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล	ในสูตรตำรับ 5 มิลลิกรัม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Paracetamol 120 mg. โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม	ลดไข้ บรรเทาอาการปวด	รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง - สำหรับขนาดบรรจุขวดละ 60 มิลลิกรัมพร้อมช้อนชาให้แสดงขนาดรับประทานดังนี้ เด็กอายุ 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิกรัม)	1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรรีดยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน 2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือ เกสัชกรก่อนใช้ยา	เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส	ขวดสีชา 30 มิลลิกรัมในกล่องกระดาษพร้อมหลอดหยด (1.2 มิลลิกรัม) และขวดสีชา 60 มิลลิกรัมในกล่องกระดาษพร้อมช้อนชา

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
					<p>เด็กอายุ 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา (2.5- 5 มิลลิลิตร)</p> <p>เด็กอายุ 6 เดือน-1 ปี รับประทานครั้ง ละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)</p> <p>- สำหรับขนาด บรรจุขวดละ 30 มิลลิลิตรพร้อม หลอดหยดให้แสดง ขนาดรับประทาน ดังนี้</p> <p>เด็กอายุ 4-5 เดือน รับประทานครั้งละ 2 หลอดหยด (2.4 มิลลิลิตร)</p> <p>เด็กอายุ 2-3 เดือน รับประทานครั้งละ 1/2 หลอดหยด (1.8 มิลลิลิตร)</p> <p>เด็กแรกเกิด -1 เดือน รับประทาน ครั้งละ 1 หลอด หยด (1.2 มิลลิลิตร)</p>			

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
	18	พลาสติกออร์บรเทา ปวด	<p>ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่</p> <p>Borneol 0.21-1.00 %w/w</p> <p>Camphor 1.00-2.80 %w/w.</p> <p>Caoutchouc 30.00 %w/w</p> <p>Ethylene Glycol Salicylate 2.00-6.00 %w/w</p> <p>Eucalyptus Oil 0.50 %w/w</p> <p>Menthol 0.30-6.49 %w/w</p> <p>Methyl Salicylate 0.14-6.00 %w/w</p> <p>Peppermint Oil 0.50-2.00 %w/w</p> <p>Thymol 0.14-0.50 %w/w</p> <p>Capsaicin Extract 0.65 %w/w</p> <p>Polybutene 12.00 %w/w</p> <p>Capsicum Powder 11.00 %w/w</p> <p>Capsicum Oleoresin 3.00-11.00 %w/w</p> <p>และ/หรือ Zinc Oxide 14.00-22.00 %w/</p>	ใช้บรรเทาอาการ ปวดกล้ามเนื้อ	<p>เช็ดบริเวณผิวหนัง ที่จะปิดให้สะอาด และแห้ง</p> <p>ปิดพลาสติกตรง บริเวณที่มีอาการ ปวด ควรเปลี่ยนวัน ละ 1-2 ครั้ง</p>	อย่าใช้พลาสติกนี้ใน บริเวณเข็มนวดนวดตา หรือบริเวณบาดแผล เปิด	เก็บในที่เย็น และ ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	10 แผ่น

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
6. ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก	19	(6.1) ยาเม็ดแก้แพ้ ลด น้ำมูก คลอร์เฟนิรา มีน	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Chlorpheniramine Maleate 2 mg.	บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ น้ำมูก ไหล	รับประทานทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทาน ครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่ ควรรับประทาน เกินวันละ 12 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ไม่ควร รับประทานเกินวัน ละ 6 เม็ด	1) ไม่ควรใช้ยา ติดต่อกันนานเกิน 7 วัน 2) ยานี้อาจทำให้เกิด อาการง่วงซึม จึงไม่ ควรขับขี่ยานยนต์หรือ ทำงานเกี่ยวกับเครื่อง จักรกล และหลีกเลี่ยง เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ผสม	เก็บที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 40 องศา เซลเซียส	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 6 เม็ด แผง พลาสติกหรือ อลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
	20	(7.1) ยาน้ำแก้ไอขับ เสมหะสำหรับเด็ก	ในสูตรตำรับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Ammonium Carbonate 0.02 g. Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml.	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ	รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร) เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา ( 5 มิลลิลิตร) เด็ก 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)		เก็บที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 40 องศา เซลเซียส และ ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	ขวดละ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
7. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ	21	(7.2) ยาแก้ไอ น้ำดำ	ในสูตรตำรับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml. Antimony Potassium Tartrate 1.2-2.0 mg. Camphorated Opium Tincture 0.6 ml.	บรรเทาอาการไอ และช่วยขับ เสมหะ	เขย่าขวดก่อนใช้ รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทาน ครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร) เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)	1) ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่ อายุต่ำกว่า 6 ปี คนชรา และหญิงมีครรภ์ 2) ห้ามใช้ยานี้ ติดต่อกันนานเกิน 3 วัน 3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ ผสมอยู่.....% ควรใช้ ด้วยความระมัดระวัง	เก็บให้พ้นมือเด็ก และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด	ขวดละ 60 มิลลิลิตร
8. ขาดมหรือทา แก้วงเวียน หน้า มืด คัดจมูก	22	(8.1) ขาดมแก้วงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Ammonium Carbonate 3.40 % W/V Strong Ammonia Solution 3.60-6.75 % V/V	ดม บรรเทา อาการวิงเวียน หน้ามืด หรือทา ผิวหนัง บรรเทา อาการเนื่องจาก พิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพิษมีพิษ	ใช้สูบสำลีดม หรือ ใช้ทา	ห้ามรับประทาน	ปิดฝาให้สนิท และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด	ขวดละ 15 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
	23	(8.2) ยาคมแก้วิงเวียน แก้คลื่นงูก	<p>ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่</p> <p>Menthol 0.07-77.90%w/v  Camphor 0.45-42.00%w/v  Methyl Salicylate 3.00-15.00%w/v  Anise Oil 0.68%v/v  Burgamot Oil 0.50-0.68%v/v  Cajuput Oil 0.50-11.00 %v/v  Cassia Oil 0.50%w/v  Clove Oil 1.25 %v/v  Dwarf-Pine Needle Oil 1.00 %w/v  Eucalyptus Oil 1.50-23.00%v/v  Lavender Oil 4.69-8.00%v/v  Peppermint Oil 2.20-10.38%v/v  Sage Oil 6.00%w/v ,Sassafras Oil 5.00%w/v  Turpentine Oil 0.71-8.00%w/v  Capsicum Tincture 4.00-8.00 %v/v  Myrrh Tincture 1.00%w/v  Ratanghia Tincture 0.40%v/v  Terpinol 3.33%v/v , Thymol 0.10%w/v  Camphor Spirit 3.00%v/v  Borneo Camphor 9.00%w/v  Bornyl Acetate 0.42%w/v  Linalyl Acetate 0.47%w/v  Phenyl Salicylate 0.60%w/v  Standard Chamomile Extract 10.00%w/v</p>	<p>บรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ</p>	<p>ใช้สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก</p>	ห้ามรับประทาน	<p>ปิดฝาให้สนิทและป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด</p>	<p>ไม่เกิน 14 มิลลิลิตร สามารถทำในรูปยาสูดดมหรือยาน้ำสำหรับสูดดม</p>

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
	24	(8.3) ยาทาระเหย บรรเทาอาการคัดจมูก ชนิดขี้ผึ้ง	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา หนึ่งหรือหลายชนิด ผสมกัน ได้แก่ Menthol 1.35-3.00%w/w Camphor 3.00-9.00%w/w Cajuput Oil 3.00%w/w Eucalyptus Oil 0.08-5.00%w/w Terpentine Oil 4.68-5.00%w/w	บรรเทาอาการคัด จมูกและลด อาการอื่น เนื่องจากหวัด	ทายาที่บริเวณลำคอ หน้าอกและหลัง	ห้ามรับประทาน	ปิดฝาให้สนิท และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด	ไม่เกิน 50 กรัม
9. ยาแก้เมารถ เมาเรือ	25	ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ โดเมนไฮดริเนท	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Dimenhydrinate 50 mg.	ใช้ป้องกันอาการ เมารถ เมาเรือ	ผู้ใหญ่รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด ก่อน ออกเดินทางอย่าง น้อย 30 นาที	ยานี้อาจทำให้เกิด อาการง่วงซึม จึงไม่ ควรขับขี่ยานยนต์หรือ ทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล และ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ผสม	เก็บที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 40 องศา เซลเซียส	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 2 เม็ด
10. ยาสำหรับ โรคตา	26	ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sulfacetamide Sodium 10 % w/v	รักษาอาการตา แดง ตาอักเสบ จากโรคติดเชื้อ	ใช้หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง	ห้ามใช้เมื่อเปิดใช้แล้ว เกิน 1 เดือนหรือเมื่อยา เปลี่ยนสี ขุ่น หรือมี ตะกอน	เก็บในที่เย็น อุณหภูมิระหว่าง 8-15 องศา เซลเซียส และ ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	ขวดสีชาละ 10 มิลลิลิตร
	27	ยาล้างตา	ในสูตรตำรับประกอบด้วย Sodium Chloride ใส่ Preservative ที่เหมาะสมสำหรับใช้กับยาตา ได้แก่ Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 %w/v หรือ Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01 %w/v ปรับ pH 6-8 ด้วย Buffer ที่เหมาะสม และปรับน้ำยาให้เป็น Isotonic กับน้ำตา	ใช้ล้างตาเพื่อ บรรเทาอาการ แสบตา ระคาย เคืองตา อัน เนื่องมาจาก ผง กวน สิ่งสกปรก เข้าตา	ใช้ล้างตาวัดวันละ 2-3 ครั้ง	ห้ามรับประทาน	ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	ขวดละ 120 มิลลิลิตรพร้อม ถ้วยล้างตา

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
11. ยาสำหรับโรคปากและคอ	28	ยากวาดคอ	ในสูตรตำรับประกอบด้วย Potassium Iodide 2.50 g. Iodine 1.25 g. Ethyl Alcohol (90 percent) 4.00 ml. Purified Water 2.50 ml. Peppermint Oil 0.40 ml. Glycerin to 100.00 ml.	บรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ	เติมน้ำสะอาดเท่าตัวแล้วใช้กวาดคอในผู้ใหญ่	ใช้สำหรับกวาดในคอเท่านั้น	ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	ขวดละ 15 มิลลิลิตร
	29	ยารักษาเส้นเป็นฝ้า เย็นเข็ญไวโอเลต	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Gentian Violet 1%w/v	รักษากระพุ้งแก้ม และเส้นเป็นฝ้าขาว	ใช้สำลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง	ใช้สำหรับทาในปากเท่านั้น	เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส	ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร
	30	ยาแก้ปวดฟัน	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Chlorobutanol 25g. Clove Oil to 100 ml.	บรรเทาอาการปวดฟัน	ใช้ไม้เล็กๆ พันสำลีชุบยาอุดฟันตรงที่เป็นรู	1) ระวังอย่าให้ถูกบริเวณอื่น 2) ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาทันตแพทย์	เก็บให้พ้นมือเด็ก และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	ขวดละ 8 มิลลิลิตร
	31	ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Abietis Pine Oil 0.30%v/w Anise Oil 0.25%w/w Borneol 1.66-2.00%w/w Cinnamon Oil 0.35%w/w Creosote 0.20%v/w Eucalyptus Oil 0.15-0.16%w/w Lemon Oil 0.30-0.52%v/w	ทำให้ชุ่มคอ บรรเทาอาการระคายคอ	ใช้อมให้ละลายช้าๆ ครั้งละ 1-5 เม็ด		เก็บในที่แห้งและเย็น	ไม่เกิน 100 เม็ด หรือ ไม่เกิน 30 กรัม

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
			Menthol 0.06-5.00%/w/w Peppermint Oil 0.19-3.33%/w/w Sylvestris Pine Oil 0.30%/v/w Licorice Extract 7.31-16.67%/w/w Tincture Capsicum 0.02%/w/w Amomum 1.00-4.00%/w/w Aniseed 2.00%/w/w Catechu 8.33-38.00%/w/w Cinnamon 2.00-10.00%/w/w					
		ยาอมบรรเทาอาการ ระคายคอ(ต่อ)	Clove 0.67-4.00%/w/w Costus 0.67%/w/w Fennel 1.67-2.00%/w/w Ginger 2.00-8.00%/w/w Licorice 26.67-71.38%/w/w ,Saffron 2.00%/w/w Saussurea 1.00 - 3.00%/w/w Silver Leaf 0.93%/w/w และ/หรือ Honey 1.50-2.40%/w/w					
	32	ยาอมบรรเทาอาการ เจ็บคอ	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg. 2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg. และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg.	บรรเทาอาการ เจ็บคอ	ผู้ใหญ่และเด็กอายุ ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป อมครั้งละ 1 เม็ดให้ ละลายช้าๆในปาก ทุก 2-3 ชั่วโมง	1) หากใช้ติดต่อกัน 2 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร 2) หญิงมีครรภ์และ หญิงให้นมบุตรควร ปรึกษาแพทย์หรือ เภสัชกรก่อนใช้ยา 3) ไม่ควรใช้ในเด็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี	เก็บยาในที่ อุณหภูมิไม่เกิน 30 oC	แผงอลูมิเนียม หรือแผงบลิ สเตอร์ละ ไม่เกิน 8 เม็ด

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
12. ยาใส่แผล ล้างแผล	33	ยาใส่แผล ทิงเจอร์ ไอโอดีน	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Iodine 2.0-2.5 %w/v  Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/v	รักษาแผลสด	ใช้สำลีสะอาดชุบ ยาทาที่แผล	1) หากมีอาการระคาย เคืองหรือผื่นแดง เกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยา เข้าตา	ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่ อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส	ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร
	34	ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอ ซอล	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ  Thimerosal 0.1 % w/v	รักษาบาดแผล	ใช้สำลีสะอาดชุบ ยาทาที่แผล	1) หากมีอาการระคาย เคืองหรือผื่นแดง เกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยา เข้าตา	ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่ อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส	ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร
	35	ยาใส่แผล โปวิดอน- ไอโอดีน	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ  Povidone-Iodine 10 % w/v equivalent to Iodine 1 % w/v	รักษาแผลสด	ใช้สำลีสะอาดชุบ ยาทาที่แผล	1) หากมีอาการระคาย เคืองหรือผื่นแดง เกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยา เข้าตา	ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่ อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส	ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร
	36	ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์	ในสูตรตำรับประกอบด้วย Isopropyl Alcohol Solution 70 % v/v  โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090	ทำความสะอาด บาดแผล	ใช้ทำความสะอาด รอบบาดแผล	ห้ามรับประทาน	ปิดฝาให้สนิท และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด	ขวดละ 30 มิลลิลิตร
	37	ยาเอทิลแอลกอฮอล์	ในสูตรตำรับประกอบด้วย Ethyl Alcohol Solution 70 % v/v  โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090	ทำความสะอาด บาดแผล	ใช้ทำความสะอาด รอบบาดแผล	ห้ามรับประทาน	ปิดฝาให้สนิท และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด	ขวดละ 30 มิลลิลิตร
	38	น้ำเกลือล้างแผล	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Chloride 0.9 % w/v	ทำความสะอาด บาดแผล	ใช้ทำความสะอาด รอบบาดแผล		เก็บในที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 40 องศา เซลเซียส	ขวดละ 500 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
13. ยารักษาแผล ติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	39	ยารักษาแผลติดเชื้อ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอา ซีน ครีม	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Silver Sulfadiazine 1% w/w	ใช้ทาภายนอก เพื่อรักษาการติด เชื้อของแผล ซึ่ง เกิดจากไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวก	ใช้ทาบริเวณแผลที่ เป็น ควรทำความ สะอาดแผล แล้วทา ครีมทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง (สำหรับแผลที่ถูก ไฟไหม้ ควรใช้ครีม ทุก 24 ชั่วโมง)	1) ไม่ควรใช้ยาใน หญิงมีครรภ์ และ ทารกแรกเกิด (1 เดือน แรก) 2) ในคนที่แพ้ยา Sulphonamide 3) ในผู้ที่เป็โรครัด และโรคไต	เก็บในที่อุณหภูมิ ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส	หลอดละ 5 กรัม 15 กรัม และ 25 กรัม
14. ยาบรเทา อาการปวด กล้ามเนื้อ แมลง กัดต่อย	40	ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Methyl Salicylate 1.14-50.00%w/w Camphor 1.76-25.00%w/w Menthol 3.00-20.00%w/w Cinnamon Oil 1.00-2.40%w/w Clove Oil 0.50-5.00%v/w Eucalyptus Oil 1.50-13.70%v/w Peppermint Oil 0.70-16.00%w/w Terpentine Oil 2.00-3.80%v/w Capsicum Tincture 0.80-8.00%v/v Colophony 2.51%v/w	บรรเทาอาการ ปวด บวม อักเสบ เนื่องจากแมลง กัดต่อย หรือปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ	ทาและนวดบริเวณ ที่มีอาการ	ห้ามรับประทาน	ปิดฝาให้สนิท และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด	ไม่เกิน 30 กรัม

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
15. ยาสำหรับโรคผิวหนัง	41	ยารักษาหิดเหา เบนซิลเบนโซเอต	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือBenzyl Benzoate 25 % w/v	รักษาหิด เหา และ โคน	<p>เขย่าขวดก่อนใช้ยา สำหรับเด็กเล็กให้แบ่งยา มาเติมน้ำเท่าตัว แล้วผสมให้เข้ากัน</p> <p><b>สำหรับรักษาหิด</b> อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อนๆ ถูตรงบริเวณที่มีคันแล้ว ทายานี้ให้ทั่วทั้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วจึงอาบน้ำ วันรุ่งขึ้นให้ทาซ้ำใหม่อีกครั้ง ตามวิธีเดิม</p> <p><b>สำหรับรักษาเหา</b> และ โคน ใส่งานี้ให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณ ที่มีเหาหรือ โคน ทั้งไว้ 1 วัน ถ้าเป็นมากให้ใช้ยา 2 ครั้งต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาด เมื่อครบ 7 วันให้ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่หาย ให้ใส่งานี้ตามวิธีเดิม</p>	ระวังอย่าให้ยาเข้าตา	เก็บในที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 25 องศา เซลเซียส และ ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	ขวดสีชา 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
	42	ยารักษาหิด ขี้ผึ้งกำมะถัน	ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sublimed Sulphur 10 % w/w	รักษาโรคหิด	ใช้ทาบริเวณที่เป็น หิด วันละ 2-3 ครั้ง	ถ้าเกิดอาการระคาย เคืองต่อผิวหนังให้ หยุดใช้ยา	เก็บในที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 40 องศา เซลเซียส	หลอดละ 5 กรัม และ 15 กรัม
	43	ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า	ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Benzoic Acid 2.5-6.5 %w/w Salicylic Acid 3.0-5.0 %w/w	รักษากลาก เกลื้อน และ โรค น้ำกัดเท้า	ใช้ทาบริเวณที่เป็น โรค วันละ 2-3 ครั้ง	ถ้าเกิดอาการระคาย เคืองต่อผิวหนังให้ หยุดใช้ยา	เก็บในที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 40 องศา เซลเซียส	หลอดละ 5 กรัม และ 15 กรัม
	44	ยารักษาโรคผิวหนัง เรื้อรัง	ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Coal Tar 1 % w/w	รักษาโรคผิวหนัง เรื้อรังบางชนิด เช่น เรื้อนกวาง ผิวหนังเป็นผื่น คัน	ใช้ทาบริเวณที่เป็น โรค วันละ 2-3 ครั้ง	ถ้าเกิดอาการระคาย เคืองต่อผิวหนังให้ หยุดใช้ยา	เก็บในที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 40 องศา เซลเซียส	หลอดหรือขวด ละ 5 กรัม และ 15 กรัม
	45	ยาทาแก้ผดผื่นคัน คา ลาไมน์	ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Calamine 8-15 %w/v Zinc Oxide 3-12 %w/v	บรรเทาอาการคัน เนื่องจากผดผื่น คัน ลมพิษ	เขย่าขวดก่อนใช้ยา ทาบริเวณที่เป็นวัน ละ 3-4 ครั้ง	ห้ามรับประทาน	ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	ขวดละ 60 มิลลิลิตร 120 มิลลิลิตร และ 180 มิลลิลิตร
	46	ยารักษาเกลื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต	ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Thiosulfate 100 %w/w	รักษาเกลื้อน	เติมน้ำสะอาดจนถึง คอขวด เขย่าผสม กัน จนตัวยาละลาย หมด (จะได้ความ เข้มข้นประมาณ 25%) ใช้ทาบริเวณ ที่เป็นเกลื้อน หลัง อาบน้ำ วันละหลาย ครั้ง	ยาที่ผสมน้ำแล้วควร ใช้ภายใน 15 วัน	ป้องกันไม่ให้ถูก แสงแดด	ขวดละ 15 กรัม สำหรับผสมน้ำ เป็น 60 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
16. ยาบำรุงร่างกาย	47	ยาเม็ดวิตามินบีรวม	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate 5 mg. Pyridoxine Hydrochloride 2 mg. Riboflavine 2 mg . Nicotinamide 20 mg.	ป้องกันการขาดวิตามินบี และบำรุงร่างกาย	รับประทานวันละ 1 ครั้งหลังอาหาร ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด		เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
	48	ยาเม็ดวิตามินซี	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Ascorbic Acid 100 mg.	ป้องกันการขาดวิตามินซี	รับประทานวันละ 1 ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด	ห้ามใช้เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี	เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
	49	ยาเม็ดบำรุงโลหิตเฟอร์รัส ซัลเฟต	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Ferrous Sulfate Equivalent to Iron 60 mg.	รักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่	รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร	1) ในช่วงรับประทานยาอาจจะจะมีสีดำ 2) หากเกิดอาการไม่สบายท้อง คลื่นไส้ ควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือค่อยๆเพิ่มขนาดของยาจนถึงขนาดที่แนะนำให้ใช้	เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

กลุ่มอาการรักษา	ลำดับ	รายการ	สูตรตำรับ	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน	การเก็บรักษา	ขนาดบรรจุ
	50	ยาเม็ดวิตามินรวม	ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Vitamin A 2,500 I.U. Vitamin D 300 I.U. Vitamin C 15.00 mg. Vitamin B1 Mononitrate 1.00 mg. Vitamin B2 0.50 mg. Nicotinamide 7.50 mg.	ป้องกันการขาด วิตามินสำหรับ ผู้ใหญ่	รับประทานวันละ 1 เม็ด	ยานี้อาจสะสมใน ร่างกายจนทำให้เกิด อันตรายได้ จึงไม่ควร ใช้เกินขนาดที่กำหนด ไว้หรือใช้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง	เก็บในที่แห้งและ เย็น และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
	51	น้ำมันตับปลาชนิด แคปซูล	ในสูตรตำรับ 1 แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Cod Liver Oil equivalent to Vitamin A ไม่เกิน 4,000 I.U. Vitamin D ไม่เกิน 300 I.U.	ป้องกันการขาด วิตามิน A และ D	ผู้ใหญ่รับประทาน วันละ 1 เม็ด	ยานี้อาจสะสมใน ร่างกายจนทำให้เกิด อันตรายได้ จึงไม่ควร ใช้เกินขนาดที่กำหนด ไว้หรือใช้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง	เก็บในที่แห้งและ เย็น และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด	แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
	52	น้ำมันตับปลาชนิดน้ำ	ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Cod Liver Oil equivalent to Vitamin A ไม่เกิน 4,000 I.U. Vitamin D ไม่เกิน 300 I.U.	ป้องกันการขาด วิตามิน A และ D	เขย่าขวดก่อนใช้ เด็กอายุตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป รับประทาน วันละ 1 ช้อนชา เด็กอายุ 1-4 ปี รับประทานวันละ 1/2 ช้อนชา เด็กแรกเกิด -1 ปี รับประทานวันละ 1/4 ช้อนชา	ยานี้อาจสะสมใน ร่างกายจนทำให้เกิด อันตรายได้ จึงไม่ควร ใช้เกินขนาด ที่กำหนด ไว้หรือใช้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง	เก็บในที่แห้งและ เย็น และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด	ขวดละ 120 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 400 มิลลิลิตร